WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C12N 15/87, C07K 14/02, C12N 15/36, 15/86, A61K 48/00, 47/48

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 95/06745

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

9. März 1995 (09.03.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE94/01003

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 24. August 1994 (24.08.94)

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(30) Prioritätsdaten:

P 43 29 811.7 P 43 39 922.3 3. September 1993 (03.09.93) DE 19. November 1993 (19.11.93) DE Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT (71) Anmelder: FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Hofgartenstrasse 2, D-80539 München (DE).

(72) Erfinder: STRAUSS, Michael; Parkstrasse 3, D-13187 Berlin (DE). SANDIG, Volker, Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE). HOFMANN, Christian; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).

(74) Anwalt: BAUMBACH, Fritz; BioTeZ Berlin-Buch GmbH, Patentstelle, Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin ŒĐ.

(54) Title: VECTOR FOR GENE THERAPY OF THE LIVER

(54) Bezeichnung: VEKTOR FÜR LEBER-GENTHERAPIE

(57) Abstract

A liver-specific, gene therapy vector finds applications in medicine and genetic engineering. The object of the invention is to develop a vector that finds liver cells with high specificity, is effectively absorbed by the cells and may inject the imported therapeutic genes into the cell nucleus. The vector should be suitable for the gene therapy of human beings. The vector according to the invention is characterised in that a therapeutic gene coupled to a promoter is packed in a polypeptide sheath and coupled to components of hepatitis B virus.

(57) Zusammenfassung

Die Ersindung betrifft einen Vektor für die leberspezifische Gentherapie; Anwendungsgebiete sind die Medizin und die Gentechnik. Ziel der Ersindung ist die Konstruktion eines Vektors, der Leberzellen hochspezisisch sindet, von den Zellen essektiv ausgenommen wird und eingebrachte therapeutische Gene in den Zellkern einschleusen kann. Der Vektor soll für die Gentherapie beim Menschen einsetzbar sein. Der erfindungsgemäße Vektor ist dadurch gekennzeichnet, daß ein therapeutisches, an einem Promotor gekoppeltes Gen mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis-B-Virus gekoppelt wird.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

	idungen gemass dem 101 vara			MIR	Mauretanien
	Österreich	GA	Gabon	MW	Malawi
AT		GB	Vereinigtes Königreich	NE	Niger
ΑŪ	Australien	GE	Georgien	NL	Niederlande
BB	Barbados	GN	Guinea		Norwegen
BE	Belgien	GR	Griechenland	NO	Neusecland
BF	Burkina Faso	HU	Ungara	NZ	
BG	Bulgarien ·	IE.	Iriand	PL	Polen
BJ	Benin	_	Italien	PT	Portugal
BR	Brasilien	<u> </u>	_	RO	Rumänien
BY	Belarus	JP	Japan	RU	Russische Föderation
CA	Kanada	KE	Kenya	SID	Sudan
	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Kongo	KP		SI	Slowenica
CG		KR	Republik Korea	SK	Slowakel
CH	Schweiz	KZ	Kasachstan	SN	Senegal
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	7D	Tachad
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka		Togo
CN	China	LU	Linemburg	TG	Tadschikistan
CS	Tachechoslowakei	LV	Lettland	TJ	Trinidad und Tobago
CZ	Techechische Republik	MC	Monaco	TT	
DE	Deutschland		Republik Moklau	UA	Ukraine
DK	Dinemark	MD		US	Vereinigte Staaten von Amerika
ES	Spanien	MG	Madagaskar	UZ	Usbekistan
	Finnland	MIL	Mali	VN	Vietnam
Ħ	-	MN	Mongolei		
FR	Prankreich				

Vektor für Leber-Gentherapie

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Vektor für die leberspezifische Gentherapie; Anwendungsgebiete sind die Medizin und die Gentechnik.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Methoden und Vektoren für die Gentherapie entwickelt worden (Übersicht in Mulligan /1993/ Science 260, 926). Dabei werden viele Vektoren, vor allem solche, die von Retroviren oder Adenoviren abgeleitet sind, favorisiert. Beide Virus-Vektortypen sind relativ breit anwendbar, wobei retrovirale Vektoren nur bei teilungsfähigen Zellen effektiv sind und Adenoviren auch bei ruhenden Zellen funktionieren. Beide Vektortypen sind zwar für die Genübertragung in Leberzellen (Hepatozyten) in vitro geeignet, können aber für eine in vivo Anwendung zur Gentherapie beim Menschen kaum in Betracht gezogen werden. Während für die Anwendung retroviraler Vektoren eine Leberteilresektion zur Stimulierung von Zellteilung (Regeneration) erforderlich wird, ist der adenovirale Gentransfer nicht sehr stabil (keine Integration in das Genom).

Alternative Vektoren mit potentieller Anwendbarkeit für den Lebergentransfer basieren auf Liposomen oder auch auf Multikomponenten-Partikeln mit Proteindomänen, die spezifisch an bestimmte Rezeptoren der Leber (z.B. Asialoglykoprotein-Rezeptor) binden und durch deren Internalisierung in die Zelle aufgenommen werden können (Übersicht in: Versland et al /1992/Seminors in Liver Disease 12, 332). Ein wesentlicher Nachteil dieser Vektoren besteht in der Aufnahme über den endozytokischen Weg, der zu einer Degration eines großen Teils der Vektoren und ihrer DNA in den Endosomen führt, so daß nur wenig funktionsfähige DNA den Zellkern erreichen kann.

Eine Lösung für dieses Problem wurde zwar für die in vitro Anwendung gefunden; diese ist aber nicht auf die Situation in vivo (am Patienten) anwendbar. Sie basiert auf der gleichzeitigen Infektion der Zielzellen mit Adenovirus, was zur Auflösung der Endosomen und Freisetzung von Vektor (DNA) führt. (Curiel, D.T., Agrawal, S., Wagner, E. und Cotten, M. 1991, PNAS 88, 8850-8854).

Ziel der Erfindung ist die Konstruktion eines Vektors, der Leberzellen in vivo hochspezifisch findet, von den Zellen effektiv aufgenommen wird und eingebrachte therapeutische Gene in den Zellkern einschleusen kann. Der Vektor soll für die Gentherapie beim Menschen einsetzbar sein.

Die Erfindung wird gemäß Anspruch 1 realisiert, die Unteransprüche 2 - 9 sind Vorzugsvarianten.

Erfindungsgemäß wird ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, in eine Polypeptidhülle verpackt und mit Proteindomänen des HBV chemisch, enzymatisch oder über Antikörper gekoppelt. Als therapeutisches Gen wird die cDNA eines Gens verwendet, das bei der zu behandelten Krankheit defekt ist, d. h. fehlt oder durch Mutation verändert ist.

Beispiele für solche Gene sind das LDL-Rezeptor-Gen, dessen Fehlen die häufigste Stoffwechselerkrankung der Leber, die familiäre Hypercholesterinämie, verursacht, und das Alpha-1-Antitrypsin-Gen.

Als Promotoren dienen leberspezifische Promotoren, bevorzugt Promoter/Enhancer des Hepatitis-B-Virus wie z.B. die Kombinationen core-Promoter/ enhancer II. Sie sind neben ihrer Spezifität auch klein genug, um leicht in einen Expressionsvektor eingebaut werden zu können. Auch in Betracht für die Konstruktion des erfindungsgemäßen Vektors kommen Promotoren leberspezifischer Gene wie Albumin, PEPCK (Phosphoenolpyruvat-carboxykinase) oder OTC (Ornithintranscarbamylase).

Die für die Verpackung verwendete Polypeptidhülle besteht vorzugsweise aus chromosomalem Protein wie z. B. gereinigtem HMG1. Gleichermaßen geeignet sind auch andere DNA-bindende Proteine wie z. B. Protamine oder Hepatitis-core-Protein. Dieses Protein ist deshalb besonders geeignet, weil es außer seiner DNA-Bindungs- und DNA-Kondensationsfähigkeit eine natürliche Komponente des Hepatitis-B-Virus ist und deshalb den Einbau in Virushüllen begünstigt.

Die Polypeptidhülle kann gemäß der Erfindung auch aus Polyaminosäuren eines Typs basischer Aminosäuren hergestellt werden, wobei sich in erster Linie Poly-L-Lysin und Poly-L-Ornithin eignen.

2

Das erfindungsgemäß als gekoppelte Komponente eingesetzte partikuläre prä-S1/S-Protein des Hepatitis-B-Virus kann aus Virus-produzierenden Zellen isoliert werden. Prä-S1/S-Protein wird aber aus Sicherheitsgründen vorteilhafterweise gentechnisch hergestellt. Derartige Nukleinsäure-freie Partikel stellen von der äußeren Oberfläche gesehen eine vollständige Virushülle dar. Damit hat der resultierende Vektor eine hohe Homologie zum natürlichen Hepatitis-B-Virus und kann deshalb den Infektionsmechanismus nachvollziehen.

Anstelle der Verwendung der kompletten Virushüllproteine läßt sich die Erfindung auch mit Liposomen als Transportvehikeln realisieren. Dabei wird die Oberfläche der verwendeten Liposomen durch prä-S1/S-Protein so modifiziert, daß eine Aufnahme über Hepatitis-B-spezifischen Mechanismen möglich ist.

Die Herstellung der Vektoren erfolgt gemäß Anspruch 10, die Unteransprüche 11 - 13 sind Vorzugsvarianten. Ein vorteilhaftes Verfahren besteht z.B. darin, daß die Kopplung des in HMG1 verpackten Gens an prä-S/S1-Proteine des HBV kovalent mittels Transglutaminase-Reaktion erfolgt.

Der erfindungsgemäße Vektor ermöglicht, ein gewünschtes Gen in das Gewebe, insbesondere die Leber eines Patienten einzuführen und seinen Weg zum Funktionsort optimal zu gestalten. Das erfolgt beispielsweise dadurch, daß der Vektor konfektioniert und einem Patienten über die Blutbahn, vorzugsweise über die Portalvene der Leber, verabreicht wird. Mit der Erfindung wird eine wesentliche Voraussetzung für eine Therapie genetischer Erkrankungen der Leber geschaffen.

Die Erfindung soll nachfolgend durch ein Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

Anwendungsbeispiel

1. Expression von HBV-Hüllproteinen in Insektenzellen

Die Hülle des HBV-Virus besteht aus drei Proteinen. Sie sind Translationsprodukte eines offenen Leserahmens im HBV-Genom'mit unterschiedlichen Initiationsstellen. Während das große Hüllprotein (L: P39, GP42) die Domänen Prä-S1, Prä-S2 und S enthält, besteht das mittlere (M: P33, GP36) aus Prä-S2 und S und das kleine Hüllprotein (S: P24, GP27) nur aus der Domäne S.

Die Gene des kleinen (S) und großen (L) HBV-Hüllproteins werden durch Amplifikation aus dem Genom des Hepatitis B Virus (Subtyp ayw) gewonnen. Für das L-Gen werden verschiedene Varianten erstellt, um die Sekretion des Proteins zu erleichtern. Sie kodieren für ein N-terminal verkürztes L-Protein (Deletion der Aminosäuren 1-6), ein L-Protein, dessen Myristilierungsort mutiert wird (Aminosäure 2 Gly-->Ala) bzw. eine Fusion mit der Mellitin-Signalsequenz.

Alle Gene werden einzeln in den Baculovirus-Transfervektor PVL941 (Pharmingen) kloniert und stehen unter Kontrolle des Polyhedrin-Promoters. Nachträglich wird ein DNA-Fragment, bestehend aus dem Polyhedrin-Promoter und dem S-Gen in alle Vektoren, die Varianten des L-Gens enthalten, derart eingefügt, daß beide Expressionseinheiten in gleicher Orientierung vorliegen und von Baculovirus-Sequenzen flankiert sind.

Die rekombinanten Plasmide und Baculovirus-DNA (BaculoGold, Pharmingen) werden mit Lipofectin in Spodoptera frugiperda-Zellen (Sf9) kotransfiziert. Durch homologe Rekombination zwischen Plasmid und Virus-DNA werden rekombinante Baculoviren erzeugt, welche die HBV-Hüllproteine unter Kontrolle des Polyhedrinpromoters in infizierten Sf9-Zellen expremieren. Die Synthese dieser Proteine wird im Westernblot nachgewiesen. Elektronenmikroskopisch wird gezeigt, daß die Hüllproteine zu Partikeln assoziieren.

Nach wiederholter Passagierung der Viren auf Sf9-Zellen werden Spinnerkulturen (10° Sf9-Zellen) infiziert. 72 Stunden nach Infektion werden die Zellen durch Sedimentation gewonnen und mittels Ultraschall aufgeschlossen. Nach Abtrennung von Membranen durch Sedimentation erfolgt die Reinigung der Hüllpartikel

wahlweise durch Zentifugation im CsCl-Dichtegradienten oder durch Affinitätschromatografie. Hierbei finden S-spezifische monoklonale Antikörper Anwendung.

2. Expression und Reinigung von HMG1

Das Gen des Nichthistonproteins HMG1 der Ratte wird aus dem Vektor zur bakteriellen Expression pT7RNHMG1 [Bianchi, E., Gene, 104 (1991) 271-275] entnommen und in den Baculovirus-Transfervektor PVL941 kloniert. Rekombinante Baculoviren werden nach dem für HBV-Gene beschriebenen Verfahren erzeugt. Der Expressionsnachweis erfolgt durch Coomassiefärbung der Proteine nach SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese.

Zur Reinigung von Ratten-HMG1 aus infizierten Sf9-Zellen wird ein Zelllysat durch Aufschluß mit Ultraschall erzeugt, Membranen durch Sedimentation abgetrennt und das Lysat mit 2% TCA gefällt. Der Überstand wird anschließend einer Azetonfällung im sauren Milieu unterzogen. Das entstehende Präzipitat wird gelöst und durch Ionenaustauschchromatographie über eine Mono Q-Säule im Kochsalzgradient fraktioniert. Die bei 1,7M NaCl eluierte Fraktion enthält elektrophoretisch reines HMG1.

3. Herstellung von DNA-HMG1-Komplexen

Nach Böttger et al. [Biochim. Biophys. Acta 950 (1988) 221-228] wird Plasmid-DNA der Form 3 sequenzunabhängig von HMG1 gebunden und kondensiert.

Die Bildung der DNA-Protein-Komplexe erfolgt durch schrittweise Zugabe eines zwanzigfachen Masseüberschusses an HMG1 zu einer DNA-Lösung von $50\mu g/ml$ in 150mM NaCl 10mM Tris/HCl bei pH 8,0. DNA-Bindung und Kondensation werden durch Gelretardation und Sedimentation im Sacharosegradienten nachgewiesen.

4. Bindung von DNA-HMG1-Komplexen an HBV-Partikel

HBV-Hüllproteine werden mittels Transglutaminase kovalent mit HMG1 vernetzt. In dieser Reaktion treten ϵ -Aminogruppen der Lysine im HMG-Molekül als Acyl-Akzeptor und γ -Karboxamidgruppen der Glutaminreste im HBV-L und S-Protein als Acyldonor auf.

Die Reaktion wird 1h bei 37°C in 150mM NaCl, 10mM CaCl, 20mM Tris/HCl pH 8,0 mit 0,5 Einheiten Meerschweinchen-Transglutaminase bei einem Masseverhältnis von HMG1: HBVL+S = 10:1 durchgeführt.

5. Infektion primärer humaner Hepatozyten mit dem Gentransfervektor

Eine konfluente Monolayerkultur humaner Hepatozyten wird 5 Tage nach Anlage für 12 Stunden mit dem Transfervektor infiziert. Das Plasmid pBAG [Proc. Natl. Acad. Sci. 84 (1987) 156-160], das das Gen der β-Galaktosidase aus *E.coli* unter Kontrolle eines retroviralen LTR enthält, wird in den Vektor verpackt. Der Nachweis des Gentransfers erfolgt 48 Stunden nach Infektion durch den *in situ*-Enzymtest für β-Galaktosidase.

Patentansprüche

1. Vektor für die gewebespezifische Gentherapie, gekennzeichnet dadurch, daß ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis B-Virus gekoppelt wird.

- 2. Vektor für die leberspezifische Gentherapie nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis B-Virus gekoppelt wird.
- 3. Vektor nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß als therapeutisches Gen die cDNA eines Gens verwendet wird, das bei der zu behandelnden Krankheit defekt ist.
- 4. Vektor nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet dadurch, daß als Promotor ein leberspezifischer Promoter, bevorzugt ein Promoter/Enhancer von Hepatitis B verwendet wird.
- 5. Vektor nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus einem chromosomalen Protein, vorzugsweise aus gereinigtem HMG1, besteht.
- 6. Vektor nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus core-Protein von von Hepatitis B besteht.
- 7. Vektor nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus Polyaminosäuren eines Typs basischer Aminosäuren hergestellt wird.
- 8. Vektor nach Anspruch 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch, daß als gekoppelte Komponente partikuläres prä-S1/S-Protein des Hepatitis B-Virus eingesetzt wird.

9. Vektor nach Anspruch 1 bis 8, gekennzeichnet dadurch, daß als gekoppelte Komponente Liposomen mit gebundenem prä-S1-Peptid eingesetzt werden.

- 10. Verfahren zur Herstellung des Vektors nach Anspruch 1 bis 9, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung des verpackten Gens an die Komponente(n) des Hepatitis B-Virus chemisch, enzymatisch oder über Antikörper durchgeführt wird.
- 11. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit einem bifunktionellen Linker, 3bevorzugt SPDP, durchgeführt wird.
- 12. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit Transaminase durchgeführt wird.
- 13. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit bispezifischen Antikörpern durchgeführt wird.
- 14. Verfahren zur Anwendung des Vektors nach Anspruch 1 bis 9, gekennzeichnet dadurch, daß der Vektor konfektioniert und einem Patienten über die Blutbahn, vorzugsweise über die Portalvene der Leber, verabreicht wird.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

		FCI	, DE 34, 01000 ·
A. CLASSII IPC 6	TCATION OF SUBJECT MATTER C12N15/87 C07K14/02 C12N15/ A61K47/48	36 C12N15/86	A61K48/00
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		·
Minimum do IPC 6	cumentation searched (classification system followed by classifica C12N C07K A61K	ation symbols)	
Documentation	on searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in	the fields searched
Plectronic da	ta base consulted during the international search (name of data be	ase and, where practical, search t	terms used)
		·	
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the	micrant passages	Relevant to claim No.
Category *	Citation of mocument, with interesting where appropriately		
Y	CELL, vol.46, 1986, CAMBRIDGE, NA US pages 429 - 436		1-7, 10-14
	NEURATH A. R. ET AL. 'Identifica chemical synthesis of a host cel binding site on hepatitis B virusee the whole document	1 receptor	
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY. vol.267, no.3, January 1992, BAL	TIMORE, MD	1-7, 10-14
	pages 1953 - 1961 KURODA S. ET AL. 'Hepatitis B vi envelope L protein particles' see the whole document	irus	
		-/	
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family member	rs are listed in annex.
"A" docume conside "E" earlier of filing of "L" docume which	egories of cited documents: Int defining the general state of the art which is not cred to be of particular relevance document but published on or after the international late Int which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	or priority date and not incited to understand the priorition "X" document of particular recannot be considered not involve an inventive step "Y" document of particular recannot be considered not involve and inventive step	after the international filing date in conflict with the application but sinciple or theory underlying the elevance; the claimed invention vel or cannot be considered to when the document is taken alone elevance; the claimed invention involve an inventive step when the
O' docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or neams ent published prior to the international filing date but	document is combined w	ith one or more other such docu- being obvious to a person skilled
	an the priority date claimed		ternational search report
	actual completion of the international search 4 November 1994		2- 1994
Name and	nailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Espen, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

ion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Citation of document, with indication, where appropriate, or the relevant paragraph	La contraction de la contracti
VACCINE, vol.7, 1989, GUILDFORD GB pages 60 - 68 YOUN B. W. ET AL. 'Purification and characterization of pre-S-containing hepatitis B surface antigens produced in	1-7,
DNA, vol.7, 1988 pages 417 - 422 pages ALT - 422 pages ALT - 422	1-7, 10-14
in the expression of the nepatities by the envelope proteins' see the whole document BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA,	1-7, 10-14
pages 221 - 228 BÖTTGER M. ET AL. 'Condensation of vector DNA by the chromosomal protein HMG1 results in efficient transfection' cited in the application see the whole document	1-7
ARCHIV FÜR GESCHWULSTFORSCHUNG, vol.60, 1990 pages 265 - 270 BÖTTGER M. ET AL. 'Transfection by DNA-nuclear protein HMG1 complexes: raising of efficiency and role of DNA topology'	1-7, 10-14
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol.267, no.16, 1992, BALTIMORE, MD US pages 11483 - 11489 WILSON J.M. ET AL. 'A novel mechanism for achieving transgene persistence in Vivo after somatic gene transfer into hepatocytes' see the whole document	1-7, 10-14
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, vol.90, March 1993, WASHINGTON US pages 2122 - 2126 CHRISTIANO R. J. ET AL. 'Hepatic gene therapy: adenovirus enhancement of receptor-mediated gene delivery and expression in primary hepatocytes' see the whole document	1-7, 10-14
	vol.7, 1989, GUILDFORD GB pages 60 - 68 YOUN B. W. ET AL. 'Purification and characterization of pre-S-containing hepatitis B surface antigens produced in recombinant mammalian cell culture' see the whole document DNA, vol.7, 1988 pages 417 - 422 PRICE P. M ET AL. 'Translational selection in the expression of the hepatitis B virus envelope proteins' see the whole document BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, vol.950, 1988 pages 221 - 228 BÖTTGER M. ET AL. 'Condensation of vector DNA by the chromosomal protein HMG1 results in efficient transfection' cited in the application see the whole document ARCHIV FÜR GESCHWULSTFORSCHUNG, vol.60, 1990 pages 265 - 270 BÖTTGER M. ET AL. 'Transfection by DNA-nuclear protein HMG1 complexes: raising of efficiency and role of DNA topology' JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol.267, no.16, 1992, BALTIMORE, MD US pages 11483 - 11489 WILSON J.M. ET AL. 'A novel mechanism for achieving transgene persistence in Vivo after somatic gene transfer into hepatocytes' see the whole document PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, vol.90, March 1993, WASHINGTON US pages 2122 - 2126 CHRISTIANO R. J. ET AL. 'Hepatic gene therapy: adenovirus enhancement of receptor-mediated gene delivery and expression in primary hepatocytes'

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	ernational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. 🗸	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: Remark: Although Claim 14 is directed to a method for treatment of the human or animal body, the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition.
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	ernational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
÷ •	
, · ·	
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Akterzeichen PCT/DE 94/01003

		PCT/DE 94/	01003
KLASSIFI PK 6	ZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C12N15/87 C07K14/02 C12N15/36	C12N15/86 A61K4	8/00
	A61K47/48		•
ich der Inter	nationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifika	tion and der IFR	
RECHER	CHIERTE GEBIETE Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
PK 6	CIZN CU/K AOIK		
ad ambiente	aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit d	iese unter die recherchierten Gebiete	fallen
101 1 4 4 1	internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name d	er Datenbank und evil. verwendete	Suchbegriffe)
ahrend der	international activities		
. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	in Retracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLANDEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der	III p	
			1-7,
Y	CELL, Bd.46, 1986, CAMBRIDGE, NA US		10-14
		- and	
	NEURATH A. R. ET AL. 'Identification' chemical synthesis of a host cell r	n and eceptor	
	binding site on hepatitis B virus		
	siehe das ganze Dokument		
	1		1-7,
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY., Bd.267, Nr.3, Januar 1992, BALTIMOR US	E, MD	10-14
	Codeon 1053 - 1961		
	PUIDODA C FT AI 'Hepatitis b Virus		
	envelope L protein particles' siehe das ganze Dokument		
	2 Jelle das demas		
,	2.7		
	·	no positio	
X w	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	Siche Anhang Patentfamilie	i Anneldelemm
1 41	tnehmen	Spätere Veröffentlichung, die nach oder dem Prioritätsdatum veröffent	
	offentlichung, die den allgemeinen stand der rechne	Anmeldung ment kontanen an Print Erfindung zugrundeliegenden Print	zips oder der ihr zugrundeliegenden
, goe	Delegant des jedoch erst am oder nach dem internationalen	Theorie angegenen me	die beenenruchte Erfindu
And Veni	offentlichung, die gezignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	erfinderischer Tätigkeit beruhend i	errechtet werden
ech:	einen zu lassen, duel die einen Brendichime belegt Weiterl	Y' Veröffentlichung von besonderer E kann nicht als auf erfinderischer T	atigkeit beruhend betrachtet
sol	oder die aus einem america Geschenung	werden, wenn die Veröffentlichtin Veröffentlichungen dieser Kategor diese Verbindung für einen Fachn	in Verhindung schracht wird und
l en	sgrührt) offentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, offentlichung, die Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht e Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht offentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach offentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Facht &" Veröffentlichung, die Mitglied der	
'P' Ver	m beauspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Absendedatum des internationales	Recherchenberichts
Datum (des Abschlusses der internationalen Recherche	14 -12-	
	24. November 1994	Bevollmächtigter Bediensteter	
Name t	and Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde	DCA/strateging \$	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tz. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Espen, J	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 94/01003

		PUT/DE 94/	
C.(Fortsetza Kategorie*	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kon	omenden Teile B	etr. Anspruch Nr.
Kategorie	Perferming del Territentiality, sower alors and August del III beautifus		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Y	VACCINE, Bd.7, 1989, GUILDFORD GB Seiten 60 - 68 YOUN B. W. ET AL. 'Purification and characterization of pre-S-containing hepatitis B surface antigens produced in recombinant mammalian cell culture' siehe das ganze Dokument		1-7, 10-14
Y	DNA, Bd.7, 1988 Seiten 417 - 422 PRICE P. M ET AL. 'Translational selection in the expression of the hepatitis B virus envelope proteins' siehe das ganze Dokument		1-7, 10-14
Y	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, Bd.950, 1988 Seiten 221 - 228 BÖTTGER M. ET AL. 'Condensation of vector DNA by the chromosomal protein HMG1 results in efficient transfection' in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument		1-7, 10-14
Υ .	ARCHIV FUR GESCHWULSTFORSCHUNG, Bd.60, 1990 Seiten 265 - 270 BÖTTGER M. ET AL. 'Transfection by DNA-nuclear protein HMG1 complexes: raising of efficiency and role of DNA topology'		1-7, 10-14
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, Bd.267, Nr.16, 1992, BALTIMORE, MD US Seiten 11483 - 11489 WILSON J.M. ET AL. 'A novel mechanism for achieving transgene persistence in Vivo after somatic gene transfer into hepatocytes' siehe das ganze Dokument		1-7, 10-14
Y	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, Bd.90, März 1993, WASHINGTON US Seiten 2122 - 2126 CHRISTIANO R. J. ET AL. 'Hepatic gene therapy: adenovirus enhancement of receptor-mediated gene delivery and expression in primary hepatocytes' siehe das ganze Dokument		1-7, 10-14

Formblatt PCT/ISA/218 (Fortsetzung von Bizit 7) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE94/01003

	m to the Right 13
Benerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchie	erbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüc	the kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr. weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Beh Bemerkung: Obwohl der Anspruch 14 sich des menschlichen/tierischen Körpers bezi geführt und gründete sich auf die angef Zusammensetzung.	eht, wurde die Recherche durch- ührten Wirkungen der Verbindung/
Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werd daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt	den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, den kann, nämlich
·	
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsp	orechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung	(Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Feld II Bemerkungen bei mangemuer Emilian	ale Anmeidung mehrere Erfindungen enthält
Die internationale Recherchenbehörde hat sestgestellt, daß diese internation	
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebi internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspr	ihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser üche der internationalen Anmeldung.
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebi internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspr Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtferügt hätte, hat die Intern Gebühr aufgefordert.	to bounts der sine
Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne eine gustzeliche Recherchengebühr gerechtferügt hätte, hat die Intern	n Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine ationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtserügt hätte, hat die Intern Gebühr ausgefordert. 3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Reclinternationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der intersind, nämlich auf die Ansprüche Nr.	n Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine ationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen